



# **2 JOURS D'ENDOSCOPIE EN FRANCE**

---

**RESULTATS DE L'ENQUÊTE 2010**

**Données Préliminaires**

Sous l'égide du Conseil d'Administration de la SFED

Pr. R. LAUGIER et Dr. C. BOUSTIERE

F. Dumeirain, Webmaster SFED et Société informatique ALSASYS



## Pour la première fois enquête en ligne sur 5 jours

### ■ 403 réponses complètes analysables

*(1039 en 2008 / 1047 en 2004 / 825 en 2001)*

### ■ 3563 Endoscopies réalisées : (7249 en 2008)

	2008		2010	
Endoscopie Oeso-gastro-duodénale	3021	42,6 %	1673	47%
Coloscopie	3802	53,6 %	1890	53%
4 % autres examens !				

**2010 : patients ayant eu Gastro + Colo = 17,5% ( 15,6 % en 2008)**

**28,4 % des coloscopies sont associées à une gastroscopie**

## STRUCTURE DE L'ÉCHANTILLON DE L'ENQUÊTE 2010 (2008)

Age des gastro-entérologues		
Moins de 35 ans	8,5 %	(10%)
De 35 à 49 ans	38,2%	(57%)
50 ans et plus	53,4 %	(33%)
Age moyen	49,3 ans	(46,6ans)
<hr/>		
Homme	79,4 %	(77%)
Femme	20,6 %	(33%)

Age moyen 2004 : 45,2 ans

Age moyen 2008 : 47.1 ans

## CONDITIONS D'EXERCICE

	2010	(2008)
HOSPITALIERS	<b>34,3 %</b>	<b>(34,4%)</b>
- CHU	- 8,9 %	
- Non CHU	- 25,4 %	
LIBERAUX	<b>51,4 %</b>	<b>(65%)</b>
Mixte (libéral + hospit)	<b>14,3 %</b>	



## Structures d'Accueil

<b>Structure d'accueil</b>	<b>Effectif</b>	<b>%</b>
Clinique privée	170	<b>43.3</b>
Hôpital	143	<b>36.4</b>
Cabinet de ville	69	<b>17.6</b>
Centre autonome	11	<b>2.8</b>
Total	393	<b>100.0</b>



Lieu d'exercice et Nombre d'habitant	
Moins de 50 000	24,7 % (34%)
50 000 à 200 000	38,7 % (35%)
> 200 000	36,6 % (32%)



## Caractéristiques des Patients

	Global		E.O.G.D.		Coloscopie	
	N	%	N	%	N	%
Age du patient						
moins de 50 ans	768	25.3	481	28.8	411	21.7
50 ans et plus	2265	<b>74.7</b>	1192	<b>71.2</b>	1479	<b>78.3</b>
	3033	100.0	1673	100.0	1890	100.0

2008: >50ans :71% ; âge moyen : 57,7ans



## Information au patient

Information donnée au patient	Global		E.O.G.D.		Coloscopie	
	N	%	N	%	N	%
Non signée	1343	44.3	889	53.1	595	31.5
Signée	1690	55.7	784	46.9	1295	68.5
	3033	100.0	1673	100.0	1890	100.0

Information donnée par HGE dans 91,8% des coloscopies





# Type de préparation

Type de préparation	%
PEG 4L	50.6
PEG 2L citrate (Moviprep)	4.23
Na/P flacons (Fleet)	5.19
Na/P comprimés (Colokit)	9.26
Pico-sulfate (CitraFleet)	19.5
Lavements	4.02
Associations de produits	7.14
<b>Nombre de prises</b>	<b>7.14</b>
Une	22.5
Deux	77.5
<b>Régime sans résidus</b>	<b>77.5</b>
Non	10.0
Oui	90.0
Total	100

## Données sur la Sédation

- Coloscopie sous anesthésie = 91,9 %
- Gastroskopie sous anesthésie = 65,03 %

## Données 2010 sur la Check List

- La C/L est elle utilisée systématiquement dans votre unité  
OUI = 85,8 %
- La C/L a t'elle permis d'éviter une erreur ou détecter un dysfonctionnement : OUI = 5,6 %
  - \* 1fois : 4,3% (6)
  - \* plusieurs fois : 5,7% (8)
- La C/L vous semble utile pour améliorer la sécurité des patients ?  
OUI = 66 %

## Données sur la Coloscopie

- Complications = 3/ 1890 (0,16%) - (39 /2892)
- Nombre de coloscopies avec polypectomie :
  - 36,5% ( 27,2% en 2008)
- Polypes :
  - > 6 mm : 53,3 % ( 52%)
  - 6 – 9 mm : 32,6% (29%)
  - 10-20 mm : 14,3% (17%)
  - > 20 mm : 6,3% (5,9%)
- Coloscopies incomplètes = 7,14 % (4,9%)
- Echecs de préparation = 3,44 % (2,1%)



# CONCLUSION

- Faire une enquête en ligne est possible
- Pour 403 répondants au lieu de 1039
- Nombre d'examens de moitié seulement
- Nombre d'examens par HGE à 9 au lieu de 7
- Valeurs phares sont très proches
- Estimation du nombre de polypes et de lésions décelées est possible