


**Objectif principal :** Évaluer le taux de récurrence après dissection sous-muqueuse d'une lésion œsophagienne.

**Population cible :** Tous les patients consécutifs adressés pour une dissection sous-muqueuse endoscopique seront inclus.

## Critères d'inclusion

1. Patients majeurs (≥ 18 ans)
2. Patients adressés pour résection endoscopique d'une lésion œsophagienne et traités par dissection sous-muqueuse
3. Patient bénéficiant d'une prise en charge dans l'un des centres investigateurs
4. Patient ayant reçu une information orale et écrite sur la recherche et ne s'étant pas opposé à sa participation
5. Patient affilié à un régime de sécurité sociale

## Schéma de la recherche



Centres	Statut
Nancy	● Ouvert aux inclusions
Jules Verne	● Ouvert aux inclusions
Rennes	● Ouvert aux inclusions
Limoges	● Ouvert aux inclusions
HEH	● En attente de signature
Hôpital privé Jean Mermoz	● En attente de signature
Bordeaux	● En attente de signature

**Centres ouverts – premières inclusions attendues prochainement.**

**CHARGÉE DE PROJET**  
**Dr. Maira MORENO**  
[rechercheclinique@sfed.org](mailto:rechercheclinique@sfed.org)  
 Tél : 04 72 11 75 13

**INVESTIGATEUR COORDONATEUR**  
**Dr Bertrand BRIEAU**  
[bertrand.brieau@gmail.com](mailto:bertrand.brieau@gmail.com)

Etude multicentrique	Echantillon	Période d'inclusion	Suivi	Durée de l'étude
22 centres	750 patients	5 ans	5 ans	10 ans